



Ministerio de Salud
Gobierno del Chubut

Preguntas frecuentes

Brote de Hantavirus

14 de enero 2019



¿Quién tiene que usar barbijo N95?

La persona afectada de hantavirus, en el momento que se lo indique el equipo de salud.

El equipo de salud que asiste a la persona afectada de Hantavirus.

Las personas con indicación de aislamiento respiratorio, a las que se las consideró contacto estrecho.

¿Qué es un contacto estrecho?

Contacto estrecho es la persona que vive en la misma casa que el enfermo con Hantavirus. Es la persona que compartió media hora o más con el enfermo cuando comenzaba el cuadro febril o 48 hs antes de que aparecieran los síntomas.



¿Cualquier barbijo sirve?

El barbijo de uso correcto es el N95.

Si estoy dentro del grupo con indicacion de aislamiento ¿Que barbijo tengo que usar?

Barbijo N95, cualquier marca y sin válvula de respiración.



Si tengo un comercio ¿Qué tengo que hacer?

- Mantener ventilado el lugar.
- Realizar la limpieza diaria con lavandina (dilución de un pocillo en un balde de 10 litros de agua)
- Mantener la distancia de atención de 1 metro o más, o mesa/escritorio/mostrador de por medio.
- Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón
- Disponer de alcohol en gel. Recordar que el alcohol en gel no reemplaza el correcto lavado de manos.



¿Los animales domésticos pueden contagiarse hantavirus?

El reservorio de hantavirus es el ratón colilargo. No se ha encontrado animales domésticos infectados por hantavirus.

¿Qué cosas si me pueden contagiar?

La orina y materia fecal del ratón colilargo infectado de hantavirus, y aquellas personas con diagnóstico de Hantavirus al momento de iniciar el cuadro febril o 48 hs antes de la aparición de los síntomas.



¿Si ya tuve Hantavirus me puedo volver a contagiar?

No.

Una persona que haya tenido Hantavirus y ya fue dada de alta ¿puede contagiar a otras personas?

No. El período de contagio entre personas ocurre en los primeros días del inicio del cuadro febril.



¿ Qué hago para no contagiarme?

- Evitar el contacto estrecho con una persona con diagnóstico de Hantavirus en el momento en que presentó los síntomas (charlas de mate, besos, abrazos, etc.).
- Mantener la higiene dentro y fuera del hogar (ej: desmalezado) para mantener alejados los roedores.
- Mantener la leña lejos del hogar y precaución al manipularla.
- Lavado frecuente de manos.
- Ventilar por una hora los espacios cerrados por largo tiempo.
- Ingresar con barbijo a los lugares que han estado cerrados por mucho tiempo.
- Desmalezar con barbijo.



¿Cuánto tiempo debo estar con indicación de aislamiento ?

El tiempo de aislamiento es el que le indica el equipo de Salud (30 días a partir del momento del contacto estrecho).

¿Cómo debo seguir luego de la fecha establecida?

Luego de terminar el período de aislamiento puede continuar con sus actividades cotidianas.



Si estoy aislado, no puedo salir de mi casa y tengo síntomas o me siento mal ¿qué hago?

Dar inmediato vía telefónica al equipo que lo está acompañando, para que el personal del hospital local lo asista.



Estoy aislado y tengo necesidades (comida, certificado para el trabajo, asistencia psicológica, etc.) ¿Qué hago?

Dar aviso al equipo que lo asiste para que a través de ellos se resuelvan sus necesidades.



¿Cuáles son los síntomas de Hantavirus?

- **Fiebre mayor a 38°**
- **Dolores musculares**
- **Dolor de cabeza**
- **Malestar general**
- **Síntomas gastrointestinales (diarreas, vómitos, dolor abdominal)**

¿Cómo se usa correctamente el barbijo?

Asegúrese que ambos bordes están totalmente desplegados.



Sostenga el respirador con una mano con los bordes abiertos en dirección a la cara. Tome ambas bandas de ajuste con la otra mano. Coloque el respirador por debajo de la barbilla, con el clip nasal hacia arriba, y tire de las bandas de ajuste por encima de la cabeza.



Coloque la banda de ajuste superior en la coronilla y la inferior en el cuello, por debajo de las orejas. Las bandas no deben quedar retorcidas. Ajuste el borde superior e inferior para mayor comodidad, asegurándose de que no están doblados.



Utilizando las dos manos, moldee el clip nasal alrededor de la nariz (parte inferior) de forma que se asegure un buen ajuste y sellado. Moldear el clip con una sola mano puede resultar en un ajuste menos efectivo.



Compruebe el ajuste antes de entrar en la zona contaminada.





¿Puedo saber con el análisis de sangre si tengo Hantavirus?

Esto depende del momento en que fue tomada la muestra de sangre.

En el momento en que se realiza la extracción de sangre, si el resultado es negativo, usted no tuvo infección con el virus.



Ministerio de Salud
Gobierno del Chubut

¿Existe una vacuna para hantavirus?

**Aun no existe disponible una vacuna que proteja contra
Hantavirus**



¿Existe un tratamiento que cure a las personas con Hantavirus?

No existe aun un tratamiento efectivo para hantavirus.

Existen alternativas de tratamiento que deben continuar investigándose .